12

チャンスを逃さな H P ワクチン接 種

8000人のうち8人ほどががんの診 りませんが、数年から十数年かけて感 がわかっています。仮にHPVに感染 ピローマウイルス)による感染で起こ しても、すぐにがんになるわけではあ 約8000人がHPVに感染すること 1万人の女性が性行為をすることで っていることをご存じでしょうか が 子宮頸がんの大半がHPV 持続することで、 手術などの治療が必要にな 感染した (ヒトパ

2900人の女性が亡くなっています。 にがんの治療で子宮を失ってしまう の女性は20代から増え始め、 しかも最近の特徴として、子宮頸がん 女性が子宮頸がんに罹患し、 国立がん研究センターの報告によれ 日本では毎年1万1000人ほど 30代まで

超えていた接種率が1%未満にまで低

ご注意いただきたいのは、

キャッチ

クチン。 種が開始されました。 術が必要になります。新型コロナウイ 発出していました。その結果、 極的接種勧奨を差し控えるとの通知を 数あったことから、 係は不明とはいえ、 6年から高校1年相当の女子に定期接 が始まり、 からだに侵入するのを防止するのがワ 接種が行われているように、 ルス感染症の1次予防としてワクチン 早期発見に役立つとはいえ、 た場合には、円錐切除など子宮への手 検診は前がん病変(異形成) 1年間に1000人ほどいるとのこと。 がんの予防法には検診がありますが 「娠できなくなってしまう) 日本でも2009年から接種 2013年4月には小学校 副反応の訴えが多 国は同年6月に積 しかし、 HPVが 発見され やがんの 7割を 因果関

女性も

す。 2007年4月1日までの女性。 2022年4月より積極的接種勧奨が 告がスウェーデンなどから相次ぎ 回とすることができます。 ワクチンの場合には、15歳未満は計2 決められた間隔をあけて同 誕 たキャッチアップ接種も始まっていま ン接種の機会を逃した方々を対象とし 再開されただけでなく、HPVワクチ ンを合計3回接種します。 チン「サーバリックス® で接種できるワクチンは、 って、子宮頸がんが予防できるとの報 -ダシル® 生日 その後、HPVワクチンの接種によ キャッチアップ接種の対象者は が1997年4月2 」、9価の「シルガード® 2 価 · 4 価の ただし9価 のワクチ 品のワク 公費 日 9

下してしまいました

🔟 HPVワクチンの一般的な接種スケジュール 厚生労働省ホームページ「HPVワクチンの接種を逃した方へ」より(一部改変) 1回目 2回目**1 3回目**2 サーバリックス® 1回目から1か月以上あける。 1回目から5か月以上、 2回目から2か月半以上あける。 6か月 2回目**3 3回目**4 1回目 ガーダシル® ※3 1回目から1か月以上あける。 2回目から3か月以上あける。 2回目※5 1回目 3回目**6 シルガード®9 1回目から1か月以上あける。 2回目から3か月以上あける。

※ いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。
※ シルガード®9は、15歳未満は1回目と2回目の接種を5か月以上あけた場合、3回目の接種は必要ない。

できる対象者はいませんか? や周囲のお子さんに、 月 働省のホームページ*を参照してくだ ャンスを逃さないで! れていることです。 アップ接種については、 ~2025年3月の3年間と決めら あなたのお子さん 公費負担で接種 詳細は厚生労 2022年 このチ



[執筆者] 北村 邦夫 きたむら くにお

日本家族計画協会 会長

自治医科大学を1期生として卒業 後、群馬県庁に在籍する傍ら、群 馬大学医学部産科婦人科学教室で 臨床を学ぶ。1988年から日本家族 計画協会クリニック所長。東京都 予防医学協会理事、日本母性衛生 学会名誉会員。2018年より現職

* ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ ~キャッチアップ接種のご案内~

